



## UNIVERSITAS SYIAH KUALA UPT. PERPUSTAKAAN

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111  
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: [helpdesk.lib@unsyiah.ac.id](mailto:helpdesk.lib@unsyiah.ac.id)

### ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

#### TITLE

GAMBARAN PERIODONTITIS KRONIS BERDASARKAN JENIS ROKOK YANG DIISAP (KRETEK DAN FILTER) PADA PASIEN DI PUSKESMAS LAMBARO ACEH BESAR

#### ABSTRACT

Nama: Fadhlul Akhyar Z.I

Nim : 0607101070058

Judul : Gambaran Periodontitis Kronis Berdasarkan Jenis Rokok yang Diisap (kretek dan filter) Pada Pasien di Puskesmas Lambaro Aceh Besar

Periodontitis kronis adalah penyakit pada jaringan pendukung gigi, diawali oleh timbulnya radang pada gingiva dan berlanjut hingga terbentuk poket periodontal, kehilangan perlekatan jaringan ikat dan mobilitas gigi. Merokok merupakan salah satu faktor risiko penyakit periodontal. Rokok kretek tidak memiliki filter sehingga tidak adanya penyaringan nikotin, tar dan karbonmonoksida. Perokok kretek mempunyai risiko lebih besar terkena periodontitis kronis dari pada perokok filter. Penelitian ini bersifat deskriptif. Subjek penelitian berjumlah 62 orang. Hasil: kedalaman poket  $\geq 5$  mm pada subjek perokok kretek berjumlah 19,35%, sedangkan kedalaman poket  $\geq 5$  mm pada perokok filter berjumlah 11,29%. Pada perokok kretek kedalaman poket  $>5$  mm berjumlah 1,61% sedangkan pada perokok filter tidak ada. Kehilangan perlekatan  $\geq 5$  mm pada subjek perokok kretek berjumlah 17,74%, sedangkan kehilangan perlekatan  $\geq 5$  mm pada perokok filter berjumlah 16,13%. Pada perokok kretek kehilangan perlekatan  $>5$  mm berjumlah 20,96% sedangkan pada perokok filter hanya berjumlah 6,46%. Simpulan: perokok kretek mempunyai kedalaman poket dan kehilangan perlekatan lebih parah dibandingkan perokok filter.

Kata Kunci :

Merokok, Jenis rokok, Periodontitis Kronis